

LABORATORIOS HIPRA, S. A.
17170 AMEX (GRONA) ESPAÑA



HIPRAMIX-AMOXI

50 mg/g premix pentru hrană medicamentată pentru porci

24kg

COMPOZITIE PER KG: Amoxicilină (trihidrat) 50 g
Făină de coajă de migdale, Parafină lichidă, Dextrină, Sorbitol.

INDICATII TERAPEUTICE:

Tratarea și prevenirea infecțiilor cauzate de Streptococcus suis sensibil la amoxicilină, la porcii înțărcați. Prezența bolii trebuie să fie stabilită înainte de începerea tratamentului.

CONTRAINDICATII: Nu administrați animalelor cu istorie cunoscută de hipersensibilitate la peniciline sau alte antimicrobiene din grupa β-lactaminelor. Nu folosiți în prezența bacteriilor ce produc β-lactamază. Nu utilizați la animalele cu tulburări renale.

REACTII ADVERSE: Reacțiile adverse cunoscute pentru peniciline sunt următoarele:

Reacția de hipersensibilitate - poate varia de la o simplă roșeață (iritație) la șoc anafilactic.

Simptome gastrointestinale: vomă și diaree.

Suprainfecția cauzată de bacterii insensibile după o folosire prelungită.

SPECII TINTĂ: Suine (după înțărcare)

DOZAJ ȘI MOD DE ADMINISTRARE: Oral, în hrană.

Premixul este administrat direct amestecat în furaj, în următoarele doze:

15 mg of amoxicilină/kg G.vie/zi. Acesta este echivalentul 0.3 g HIPRAMIX-AMOXI/kg G.vie/zi.

Pentru a calcula doza de HIPRAMIX-AMOXI administrată în hrană

g de HIPRAMIX-AMOXI per kg de furaj:

0.3 g HIPRAMIX-AMOXI	x	_____ Kg (Greutate vie)
Cantitate Consumată / zi (Kg hrană)		

Ținând cont că un porc mănâncă zilnic aproximativ 5% din greutatea corpului său, se recomandă următoarea doză: 6 kg HIPRAMIX-AMOXI/T furaj în hrană (uscată). Tratamentul trebuie să continue 15 zile consecutiv. Consumul de hrană va depinde de starea de sănătate a animalului. Astfel pentru a asigura un dozaj corespunzător trebuie ajustată concentrația în funcție de aportul zilnic de hrană.

Nu este necesară diluarea premixului înainte de introducerea sa în furaj.

Recomandări în cazul granularii furajului: temperatura nu trebuie să depășească 85 °C.

ATENȚIONĂRI PENTRU ADMINISTRARE CORECTĂ:

În cazul animalelor: Folosirea produselor medicinale trebuie bazate pe teste de sensibilitate și pe politicile locale de utilizare a antibioticilor. Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate duce la apariția de bacterii rezistente la amoxicilină. Aportul de medicament poate fi redus de starea de boală. Dacă nu este suficientă cantitatea de hrană ingerată, animalul trebuie ajutat prin administrarea antibioticilor pe cale parenterală.

Se va acorda o mai mare atenție condițiilor în care se desfășoară activitățile din fermă, în special îndeplinirea condițiilor de igienă, cele de ventilație, trebuind evitat stresul.

Precauții în cazul personalului ce administrează hrana animalelor: Penicilina și cefalosporinele pot cauza reacții de hipersensitivitate (alergii) după inhalare, ingestie, injectare sau contact cutanat. Au fost observate și reacții alergice încrucișate între peniciline și cefalosporine.

Nu manipulați produsul dacă suferiți de alergii la peniciline și/sau cefalosporine.

Manipulați medicamentul cu grijă pentru a nu inhala praful, și pentru a evita contactul cu pielea și ochii în timpul încorporării premixului în hrană:

- Luați măsurile necesare pentru a preveni diseminarea prafului în timpul încorporării premixului în hrană.

- Purtați o mască de praf (în acord cu EN140FFP1), mănuși, costum și ochelari de protecție.

- Evitați contactul cu pielea și ochii. Spălați cu apă din abundență în cazul contactului cu ochii.

- Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul manipulării medicamentului.

Dacă apar simptome ulterioare expunerii la medicament, precum iritații cutanate, consultați de urgență un medic, și arătați-i aceste instrucțiuni. Inflamarea feței, a buzelor sau a ochilor, dificultățile în respirație sunt simptome foarte serioase și necesită îngrijiri medicale urgente.

PERIOADA DE AȘTEPTARE: Suine: Carne și organe: 7 zile.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE:

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. Nu utilizați după data înscrisă pe ambalaj. Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului: 6 luni.

Termenul de valabilitate după încorporarea în furaj, inclusiv cel granulat: 6 luni.

AVERTIZĂRI SPECIALE: Nu există.

INTERACȚIUNI: A nu se administra împreună cu agenți anti-infecțioși bacteriostatici (tetraciclină și sulfamide). A nu se folosi simultan cu neomicina deoarece aceasta blochează absorbția penicilinelor pe cale orală. A nu se folosi împreună cu antibiotice care inhibă sinteza proteică bacteriană din moment ce ele s-ar putea opune acțiunii antibacteriene a penicilinei, excepție făcând doar antibioticele aminoglicozide care sunt recomandate a fi folosite cu peniciline.

PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DIN UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE PRODUSE:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu

provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie

eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Trebuie luate în considerare recomandările oficiale

referitoare la încorporarea premixurilor medicamentate

în furajele finite.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



No.de înregistrare: 080056
NUMAI PENTRU UZ VETERINAR



8 427711 118640

702428-00

000000 118640 427711 8