

MEGLUXIN

Flunixin meglumin 5%, în soluție injectabilă

COMPOZIȚIE PER ML:

Flunixin (meglumin)..... 50.000 mg

Flunixin meglumin este un medicament antiinflamator non-steroid (NSAID) cu activitate analgezică și anti-piretică.

Flunixin meglumin acționează ca inhibitor non selectiv și reversibil al ciclo oxigenazei (COX), o enzimă ce convertește acidul arahidonic în endoperoxizi ciclici instabili, care sunt apoi transformați în prostaglandine, prostaciline și tromboxani. Unii dintre acești prostanoizi, cum ar fi prostaglandinele, participă la mecanismele fiziopatologice ale inflamațiilor durerii și febrei, ceea ce înseamnă că inhibarea lor determină efectele terapeutice. Datorită implicării prostaglandinelor în alte procese fiziologice inhibarea COX poate fi responsabilă și de diversele reacții adverse cum ar fi leziuni intestinale și renale.

INDICAȚII:

Bovine: Indicat pentru controlul inflamațiilor acute și a febrei asociate cu Boala Respiratorie a Bovinelor.

Cabaline: Indicat pentru diminuarea inflamațiilor și a durerilor determinate de traume musculo – scheletice în faze acute sau cronice și în tratarea durerilor viscerale ca urmare a colicilor.

Porcine: Indicat ca un adjuvant în tratarea sindromului MMA la scroafe.

INTERACȚIUNE:

- A nu se administra concomitent cu sau la un interval mai mic de 24 de ore de la administrarea unui alt medicament NSAID.

- Unele NSAID se pot lega într-o mare măsură la proteinele plasmatiche și înlocui astfel o serie de medicamente care au această acțiune ceea ce poate cauza efecte toxice. Această interacțiune este importantă în cazul unor medicamente cu o foarte specifică acțiune terapeutică: anticoagulante, metotrexat, și unele anticonvulsivice cum ar fi fenitoina.

- Poate diminua efectul unor antihipertensive prin inhibarea sintezei prostaglandinelor. În prezența lor trebuie evitată utilizarea de diuretice tip IECA (Inhibitori ai Enzimei de Conversie a Angiotensinei), ARA (Antagonisti ai Receptorilor Angiotensinei) și Beta-blocante.

- Administrarea simultană cu produse potențial nefrotice trebuie evitată, în special ciclosporinele.

- Poate diminua eliminarea pe cale renală a unor medicamente și crește astfel toxicitatea acestora așa cum se întâmplă în cazul methotrexat-ului, aminoglicozidelor sau a sărurilor de Lithiu.

CONTRAINDICAȚII:

- A nu se utiliza la animale cu probleme hepato - renale.

- A nu se utiliza când apar semne clinice de hemoragii.

- A nu se utiliza la animale care au sensibilitate la flunixin meglumin.

- A nu se utiliza la animale dehidratate, hipovolemice, sau hipotensive.

EFFECTE NEDORITE:

Nu sunt descrise atunci când se respectă doza recomandată.

Pot apare reacții locale la administrarea intramusculară.

RUTA DE ADMINISTRARE:

Intravenos la bovine și equine.

Intramuscular la porc.

POSOLOGIE:

Bovine: Controlul inflamației acute și a febrei asociate cu Boala Respiratorie a Bovinelor: 2.2 mg de flunixin (meglumin)/kg G vie la fiecare 24 de ore pentru maximum 3 zile (echivalent cu 0.44 ml de MEGLUXIN/10 kg G vie).

Equine: Reducerea inflamațiilor și a durerilor asociate cu traume musculo - scheletice în stadii acute sau cronice: 1.1 mg de Flunixin (meglumin)/kg G vie la fiecare 24 ore pentru maximum 5 zile (echivalent cu 0.22 ml de MEGLUXIN/10 kg G vie).

Reducerea durerilor viscerale în colici: 1.1 mg de flunixin (meglumin)/kg G vie (echivalent cu 0.22 ml de MEGLUXIN/10 kg G vie). Tratamentul poate fi repetat de 1 - 2 ori dacă simptomele persistă.

Porc: Doza de 2.2 mg de flunixin (meglumin)/kg G vie prin injecții i.m. profunde (echivalent cu 0.44 ml de MEGLUXIN/10 kg G vie). Una sau două injecții pot fi administrate la un interval de 12 ore. Numărul de tratamente (unul sau două) va depinde de răspunsul clinic obținut.

SUPRADOZĂ:

- Această poate cauza anorexie, diaree, ulcer gastric, hipoproteinemie și necroză renale. În asemenea cazuri suspendați tratamentul și aplicați terapie simptomatică.

- Pot apare și semne de incoordonare în mers sau ataxie.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Bovine: Carne: 14 zile; Lapte: 2 zile.

Equine: Carne: 28 zile.

Porcine: Carne: 17 zile.

UTILIZAREA ÎN TIMPUL GESTAȚIEI ȘI A ALĂPTĂRII:

Nu există studii specifice la speciile țintă ceea ce înseamnă că raportul risc/avantaje trebuie calculat de practician înainte de utilizarea la femelele gestante.

PRECAUȚII DE UTILIZARE:

- Administrați produsul la temperatura camerei (+15 to +25 °C).

- Administrarea intravenoasă se va efectua foarte încet.

- Evitați administrarea intra-arterială la cai și vaci. Căii injectați intraarterial pot manifesta reacții adverse precum ataxie, incoordonare a mișcărilor, excitabilitate, slăbiciuni musculare.

- Consumul apei în timpul tratamentului și starea de hidratare a animalului trebuie atent monitorizată din cauza riscului crescut de apariție a leziunilor renale în cazul dehidratării.

- A nu se depăși doza recomandată sau durata tratamentului.

- Utilizarea la animale mai tinere de 6 săptămâni sau la animale foarte bătrâne reprezintă un factor de risc crescut. Dacă acest lucru nu poate fi evitat acestor animale li se va administra o doză scăzută sau vor fi atent monitorizate după administrare, cu intervențiile clinice de rigoare în caz de necesitate.

- În administrarea intramusculară la porc să se evite injectarea în țesuturi adipoase. Este preferabilă evitarea administrării de NSAID ce inhibă sinteza prostaglandinelor la animale ce au suferit procedura de anestezie generală până la revenirea lor completă.

PRECAUȚII SPECIALE:

- În caz de contact cu pielea spălați imediat cu apă.

- Pentru prevenirea eventualelor reacții evitați contactul cu pielea. Se recomandă folosirea mănușilor în timpul administrării.

- Produsul poate cauza reacții la persoanele sensibilizate. În cazul de hipersensibilitate cunoscută la NSAID, nu administrați personal acest produs. Reacțiile pot fi puternice.

- Nu permiteți contaminarea flaconului.

- În cazul autoinjectării accidentale poate apare durere acută și inflamare. Curățați și dezinfectați rana imediat și cereți ajutor medical imediat, arătând medicului instrucțiunile produsului.

OBSERVAȚII:

- A se folosi doar la recomandarea medicului.

- Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

PERIOADA DE VALABILITATE: 3 ani.

PRECAUȚII SPECIALE DE ÎNMAGAZINARE:

- Acest produs nu trebuie păstrat în condiții speciale.

- Produsul are o valabilitate de 28 de zile de la data deschiderii flaconului.

PREZENTARE:

Sticle de 100 ml

Nº de înregistrare: 070116

A se folosi doar la recomandarea medicului.

PRODUS DE UZ VETERINAR



LABORATORIOS HIPRA, S.A. - AVDA. LA SELVA, 135
17170 AMER (GIRONA) SPAIN - TEL. (34) 972 43 06 60

703242-00

09-09