

# SELECTAN

300 mg/ml, soluție injectabilă pentru bovine și porcine.

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI  
AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A  
DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE,  
RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR  
DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE:

Deținătorul autorizației de comercializare și producător:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 AMER (GIRONA) SPANIA

DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR  
ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI):

SELECTAN este o soluție injectabilă transparentă de  
culoare ușor gălbui care conține:

Florfenicol 300 mg/ml.

## INDICAȚIE (INDICAȚII):

Boli cauzate de bacterii susceptibile la florfenicol:

### Bovine:

Tratamentul terapeutic al infecțiilor tractului respirator la bovine asociate cu *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, și *Histophilus somni*.

### Porcine:

Tratamentul acceselor acute ale bolii respiratorii asociate cu tulpini de *Actinobacillus pleuropneumoniae* și *Pasteurella multocida*.

## CONTRAINDICAȚII:

Nu se administrează taurilor adulți sau viilor pentru reproducere.

Nu se administrează vacilor care produc lapte pentru consumul uman.

Nu se administrează animalelor cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

## REAȚII ADVERSE:

**Bovine:** În timpul perioadei de administrare a medicamentului se poate înregistra o scădere a consumului de alimente și o eliminare temporară de fecale moi. Aceste semne dispar repede și complet după încheierea tratamentului. Administrarea produsului poate determina apariția unor leziuni inflamatorii la locul injectării care pot persista până la 14 zile.

**Porcine:** efectele adverse înregistrate în mod normal constau în diaree temporară și/sau eritem/edem perianal și rectal care pot afecta 50% din animale. Aceste efecte pot persista timp de o săptămână. O inflamare temporară poate fi observată la locul injectării și poate dura până la 5 zile. Leziunile inflamatorii la locul injectării pot persista până la 28 de zile.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

## SPECII ȚINTĂ:

Bovine și porcine.

## POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

### Bovine:

20 mg/kg greutate corporală (1 ml de SELECTAN/ 15 kg) prin administrare pe cale intramusculară repetată la interval de 48 de ore. Volumul administrat cu fiecare injectare nu trebuie să depășească 10 ml.

### Porcine:

15 mg/kg greutate corporală (1 ml de SELECTAN /20 kg) prin administrare pe cale intramusculară în mușchii gâtului repetată la interval de 48 de ore. Volumul administrat la fiecare injectare nu trebuie să depășească 3 ml.

## TIMP DE AȘTEPTARE:

### Bovine:

Carne și organe: 30 de zile.

Nu este permisă utilizarea la animale în perioada de lactație care produc lapte pentru consum uman.

### Porcine:

Carne și organe: 18 zile.

## PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la îndemâna sau în vazul copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 28 de zile.

## ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe testele de susceptibilitate și să aibă în vedere politicile antimicrobiene oficiale și locale. Nu se utilizează la purceli de mai puțin de 2 kg.

Curățați capacul înainte de a scoate fiecare doză.

Utilizați o seringă și un ac uscate, sterile.

Trebuie să aveți grijă să nu vă injectați accidental.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

În caz de contact cu ochii, clătiți-vă imediat cu apă curată.

În caz de contact cutanat, spălați zona afectată cu apă curată.

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Persoanele cu hipersensibilitate la florfenicol, propilen glicol sau polietilen glicol trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Siguranța reproducerii în cazul utilizării nu a fost cercetată în mod special la vacile sau scroafele aflate în perioadă de gestație. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

La porcine, în urma unor supradoze, poate fi observată o reducere a ingestiei de alimente și de apă, o scădere a greutatei și vărsături.

Nu amestecați produsul medicinal veterinar cu niciun alt produs medicinal veterinar.

## PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL :

01.08.2011

## ALTE INFORMAȚII:

Cutie cu 1 flacon de 100 ml.

Cutie cu 1 flacon de 250 ml.

Pachet cu 10 flacoane de 100 ml.

Pachet cu 10 flacoane de 250 ml.

Pachet cu 12 flacoane de 100 ml.

Pachet cu 12 flacoane de 250 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com